



Oktatási Hivatal

A 2016/2017. tanévi Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny

döntő forduló

MATEMATIKA I. KATEGÓRIA (SZAKGIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA)

Javítási-értékelési útmutató

1. Felírtuk egy táblára az $1, 2, 3, \dots, 2015, 2016$ számokat. Egy lépésben két tetszőleges számot letörölve közülük, vagy az összegüket, vagy a különbségük abszolútértékét írjuk helyettük a táblára. Ilyen lépések sorozatával a táblán levő számok darabszáma csökken, végül egy szám marad a táblán.

Lehet-e az utolsó szám

- a) 2017
- b) 2016?

Megoldás:

Kezdetben a számok összege a táblán a számtani sorozat összegképlete szerint

$$(1) \quad S = \frac{1 + 2016}{2} \cdot 2016 = 2033136.$$

Eszerint a feladatban leírt lépések sorozatának végrehajtása előtt a táblán levő számok összege páros szám volt.

1 pont

Ha egy lépést végrehajtunk, és ennek során a törölt számok helyett az összegüket írjuk a táblára, akkor a táblán levő számok összege nyilvánvalóan egyenlő lesz a lépés végrehajtása előtti összeggel.

Ha pedig egy lépésben a törölt számok helyett a különbségük abszolútértékét írjuk a táblára, akkor a táblán levő számok összege a kisebb szám kétszeresével csökken a lépés előtti összeghez képest.

Tehát a megengedett lépések bármelyikének végrehajtásával a táblán maradó számok összege vagy változatlan marad, vagy páros számmal csökken.

2 pont

Mivel a lépéssorozat megkezdése előtt a számok összege páros volt, akkor ez azt jelenti, hogy a lépéssorozat végén a táblán utoljára megmaradt szám csak páros lehet, tehát 2017 nem maradhat a táblán. 1 pont

A feladat b) részének megválaszolásához megadunk egy olyan konstrukciót, amely bizonyítani fogja, hogy a táblán az utoljára megmaradt szám lehet 2016.

A konstrukció megadásához először az 1, 2, 3, ..., 2015, 2016 számok közül olyan párokat képezünk, amelyek különbségének abszolútértéke 1008, ezek a számpárok:

(1, 1009); (2, 1010); (3, 1011); ...; (1007, 2015); (1008, 2016),

ez pontosan 1008 darab számpár. 1 pont

A lépéssorozat első részében egy-egy lépés során ezeket a párokat töröljük és helyettük a különbségük abszolútértékét, vagyis 1008-at írunk a táblára.

Ezután 1008 darab 1008-as szerepel a táblán.

Az 1008 darab számból ismét párokat képezünk, ezzel a táblán pontosan 504-szer fog szerepelni az

(1008, 1008)

számpár. 2 pont

A következő lépéssorozatban az 504 számpárból 503 számpárt törölünk, és helyettük a különbségük abszolútértékét, azaz 0-t írunk a táblára.

Az utolsó

(1008, 1008)

számpárt szintén töröljük, de itt a két szám összegét írjuk a táblára. 1 pont

Ezzel azt értük el, hogy a táblán 503 darab 0 és egy darab 2016-os szám szerepel.

A táblán így megmaradt 504 darab számmal a megengedett lépések bármelyikét végrehajtva a táblán szereplő 0-ák mellett mindig pontosan egy darab 2016-os marad meg. 1 pont

A konstrukció tehát választ ad a feladat b) kérdésére; eszerint a megengedett lépések alkalmazásával a táblán utoljára megmaradó szám lehet 2016, és ez a fenti konstrukció alkalmazásával meg is valósul. 1 pont

Összesen: 10 pont


2. A síkon a C és D pontok az AB szakasz által meghatározott egyenes ugyanazon oldalára esnek úgy, hogy az ABC és ABD háromszögek körülírt köre azonos. Legyen az ABC háromszög beírt körének középpontja E , az ABD háromszög beírt körének középpontja F , a C és D pontokat nem tartalmazó AB ív felezőpontja G . Bizonyítsa be, hogy az A, B, E, F pontok egy G középpontú körön helyezkednek el!

Megoldás:

Készítsünk a feltételeknek megfelelő ábrát, amelyen legyenek az ABC háromszög belső szögei $CAB\angle = \alpha$, $ABC\angle = \beta$ és $BCA\angle = \gamma$ (1. ábra).

Az ABD háromszög D csúcsából a feltételek miatt az AB szakasz ugyanakkora szögben látszik, mint a C pontból, ezért $BDA\angle = \gamma$.

1 pont



1. ábra

Legyen az ABD háromszög másik két belső szöge $DAB\angle = \delta$ és $ABD\angle = \varepsilon$.

Az E és F pontok rendre az ABC és ABD háromszögek beírt köreinek középpontjai, tehát a két háromszög belső szögfelezőinek metszéspontjai.

Az ABC háromszögben ezért a CE egyenes felezi a γ szöget, és így felezi a γ szöghöz tartozó, a C és D pontokat nem tartalmazó AB ívet, azaz a CE egyenesre illeszkedik a G pont.

Mivel azonban a C és D pontok az AB egyenes ugyanazon oldalán vannak és

$$BCA\angle = BDA\angle = \gamma,$$

ezért az ABD háromszög DF szögfelezője ugyancsak áthalad a G ponton, vagyis a CE és DF egyenesek az ABC és ABD háromszögek közös körülírt körének G pontjában metszik egymást. 1 pont

Egy körben azonos nagyságú kerületi szögekhez azonos nagyságú ívek és azonos hosszúságú húrok tartoznak, ezért az előző eredményünk azt is jelenti, hogy

$$(1) \quad GA = GB . \quad 1 \text{ pont}$$

Az ACE háromszögben

$$EAC\hat{=} = \frac{\alpha}{2}, \quad ACE\hat{=} = \frac{\gamma}{2},$$

és mivel a $GEA\hat{=}$ az ACE háromszög külső szöge, ezért

$$(2) \quad GEA\hat{=} = \frac{\alpha + \gamma}{2} .$$

A kerületi szögek tétele miatt $CGA\hat{=} = CBA\hat{=} = \beta$, és így $EGA\hat{=} = \beta$ is teljesül, ezért a GAE háromszögben

$$GAE\hat{=} = 180^\circ - \beta - \frac{\alpha + \gamma}{2},$$

de az ABC háromszögben $\alpha + \beta + \gamma = 180^\circ$, és így $180^\circ - \beta = \alpha + \gamma$, és ebből pedig egyszerű számolással kapjuk, hogy

$$(3) \quad GAE\hat{=} = \frac{\alpha + \gamma}{2} . \quad 2 \text{ pont}$$

A (2) és (3) eredmények szerint a GAE háromszög egyenlő szárú, tehát

$$(4) \quad GA = GE . \quad 1 \text{ pont}$$

A BDF háromszögben

$$FBD\hat{=} = \frac{\varepsilon}{2}, \quad BDF\hat{=} = \frac{\gamma}{2},$$

továbbá a $GFB\hat{=}$ az BDF háromszög külső szöge, ebből azt kapjuk, hogy

$$(5) \quad GFB\hat{=} = \frac{\varepsilon + \gamma}{2} .$$

A kerületi szögek tételének alkalmazásával adódik, hogy $DGB\hat{=} = DAB\hat{=} = \delta$, ezzel $FGB\hat{=} = \delta$ is fennáll, így a GBF háromszögben

$$GBF\hat{=} = 180^\circ - \delta - \frac{\varepsilon + \gamma}{2},$$

ugyanakkor az ABD háromszögben $\delta + \varepsilon + \gamma = 180^\circ$, ezért $180^\circ - \delta = \varepsilon + \gamma$, ebből pedig azt kapjuk, hogy

$$(6) \quad GBF\hat{=} = \frac{\varepsilon + \gamma}{2} . \quad 2 \text{ pont}$$

Az (5) és (6) eredmények együttesen azt jelentik, hogy a GAE háromszög is egyenlő szárú, ezért

$$(7) \qquad \qquad \qquad GB = GF . \qquad \qquad \qquad 1 \text{ pont}$$

Az (1), (4) és (7) összefüggések szerint

$$GA = GB = GE = GF ,$$

vagyis a C és D pontokat nem tartalmazó AB ív G felezőpontja egyenlő távol van az A, B, E, F pontoktól, tehát ezek a pontok egy G középpontú körön vannak, és éppen ezt akartuk bizonyítani.

1 pont

Összesen: 10 pont

Megjegyzés:

A feladat megoldása alapján azt is beláttuk, hogy a G középpontú, $GA = GB$ sugarú körre illeszkedik minden olyan háromszög beírt körének középpontja, amelynek két csúcsa A és B , harmadik csúcsa pedig az ABC háromszög körülírt körének C pontot is tartalmazó körívére illeszkedik.

3. A valós számok halmazán értelmezett egész együtthatós

$$f(x) = ax^2 + bx + c \quad (a \cdot b \cdot c \neq 0)$$

függvényről tudjuk, hogy

$$f(a) = f(b) = f(c) = 0.$$

Adja meg az összes ilyen tulajdonságú függvényt!

Megoldás:

Az $a \cdot b \cdot c \neq 0$ feltétel miatt az $f(x) = ax^2 + bx + c$ egyik együtthatója sem lehet zérus, tehát az $f(x)$ másodfokú függvény.

1 pont

A valós számok halmazán értelmezett $f(x) = ax^2 + bx + c$ másodfokú függvénynek nem lehet három különböző zérushelye, tehát az

$$f(a) = f(b) = f(c) = 0$$

feltétel csak akkor teljesülhet, ha az $a; b; c$ együtthatók között vannak azonosak.

1 pont

Ha mindhárom együttható egyenlő, azaz $a = b = c$, akkor az $f(x)$ függvény a következő alakban írható fel:

$$(1) \quad f(x) = a \cdot (x^2 + x + 1).$$

Az (1) függvénynek azonban nincs zérushelye, hiszen $a \neq 0$ és az $x^2 + x + 1$ másodfokú függvény diszkriminánsa negatív.

Ezért az $a = b = c$ eset nem állhat fenn.

1 pont

Ha két egyenlő együttható van és a harmadik ezektől különböző, akkor több eset is lehetséges.

Ha $a = b \neq c$, akkor egyrészt $f(x) = ax^2 + ax + c$, másrészt $f(a) = f(c) = 0$, azaz

$$(2) \quad a^3 + a^2 + c = 0,$$

illetve

$$(3) \quad ac^2 + ac + c = 0.$$

A (2) és (3) egyenletek megfelelő oldalait kivonva egymásból, azt kapjuk, hogy $a^3 - ac^2 + a^2 - ac = 0$, ahonnan szorzattá alakítással

$$(4) \quad a \cdot (a - c) \cdot (a + c + 1) = 0.$$

A (4) egyenletben csak $a + c + 1 = 0$ lehetséges, hiszen a feltételek miatt $a \neq 0$, illetve $a \neq c$.

Ebből azt kapjuk, hogy

$$c = -a - 1.$$

A (3) egyenlet mindkét oldalát oszthatjuk a $c \neq 0$ számmal, ebből adódik az

$$ac + a + 1 = 0$$

egyenlet, amelybe a kapott $c = -a - 1$ összefüggést helyettesítve egyszerű számolással az

(5) $a^2 = 1$
egyenletet kapjuk.

Az (5) egyenlet megoldásai az $a = 1$ és $a = -1$ egész számok.

Ezek közül az $a = -1$ nem felel meg a feltételeknek, mert ebből $c = -a - 1$ szerint $c = 0$ következne.

A feltételek és $a = 1$ alapján $b = 1$ és $c = -2$ adódik, eszerint a feladat megoldása az

$$f(x) = x^2 + x - 2$$

másodfokú függvény, amelynek együttható egész számok.

2 pont

Ha $a = c \neq b$, akkor $f(x) = ax^2 + bx + a$, illetve $f(a) = f(b) = 0$ miatt

(6) $a^3 + ab + a = 0$,

illetve

(7) $ab^2 + b^2 + a = 0$.

A (6) és (7) egyenletek megfelelő oldalait egymásból kivonva az $a^3 - ab^2 + ab - b^2 = 0$ egyenletet kapjuk, ahonnan szorzattá alakítással

(8) $(a - b) \cdot (a^2 + ab + b) = 0$.

A (8) egyenletben $a \neq b$ miatt $a - b \neq 0$, így csak $a^2 + ab + b = 0$ lehetséges, amelyből

$$a^2 + b = -ab$$

következik.

A (6) egyenlet mindkét oldalát az $a \neq 0$ számmal osztva $a^2 + b + 1 = 0$, ahonnan

$$a^2 + b = -1$$

adódik, ezt előző eredményünkkel összevetve az

(9) $ab = 1$

egyenletet kapjuk.

A (9) egyenlet megoldásai az $a = 1; b = 1$ és $a = -1; b = -1$ egészekből álló számpárok. A feladatnak azonban egyik számpár sem megoldása, mert feltételeink szerint

$$a \neq b. \quad 2 \text{ pont}$$

Végül, ha $b = c \neq a$, akkor az $f(x) = ax^2 + bx + b$, illetve az $f(a) = f(b) = 0$ feltételeket figyelembe véve

$$(10) \quad a^3 + ab + b = 0,$$

illetve

$$(11) \quad ab^2 + b^2 + b = 0.$$

A (10) és (11) egyenletek megfelelő oldalait kivonjuk egymásból, így szorzattá alakítás után az

$$(12) \quad (a - b) \cdot (a^2 + ab + b) = 0$$

egyenletre jutunk, amelyik pontosan megegyezik az előző esetben kapott (8) egyenlettel.

A (12) egyenletben $a \neq b$ miatt $a - b \neq 0$ nem lehetséges, ezért $a^2 + ab + b = 0$, ahonnan

$$ab + b = -a^2$$

adódik.

A (11) egyenlet mindkét oldalát oszthatjuk a $b \neq 0$ számmal, ebből $ab + b + 1 = 0$, ahonnan

$$ab + b = -1$$

következik.

Az $ab + b$ kifejezésre kapott két egyenlet összevetésével

$$(13) \quad a^2 = 1.$$

A (3) egyenlet megoldásai az $a = 1$ és $a = -1$ egész számok. A feltételeknek azonban egyik szám sem felel meg, mert $a = 1$ és $ab + b = -1$ figyelembe vételével

$$b = -\frac{1}{2}$$

következne, ez pedig ellenkezik a feladat egész számokra vonatkozó feltételével, az $a = -1$ pedig $ab + b = -1$ alapján lehetetlen eredményre vezet.

2 pont

Minden lehetséges esetet megvizsgáltunk és azt kaptuk, hogy a feladat feltételeinek egyetlen függvény felel meg, az $a = b = 1$ és $c = -2$ egész együtthatókkal felírt

$$f(x) = x^2 + x - 2$$

másodfokú függvény, ez a feladat egyetlen megoldása.

1 pont

Összesen: 10 pont